



INFORME AGRONÓMICO

Abril 2025




Córdoba. Pese al ritmo lento de cosecha, la soja proyecta su mejor producción en seis años

Relevamiento del 7 al 13 de abril

Con la cosecha de girasol próxima a finalizar, se estima una producción de 291 mil toneladas, superando ampliamente el promedio histórico. En tanto, la recolección de los demás cultivos avanza de manera lenta, condicionada por factores climáticos.


Las proyecciones de producción para abril anticipan rendimientos superiores a los registrados en marzo. El cultivo de maíz lidera estas estimaciones, con un rendimiento promedio de 79 qq/ha, el más alto de las últimas tres campañas. En el caso de la soja, se prevé la producción más elevada de los últimos seis ciclos productivos.

La cosecha de girasol está próxima a concluir, mientras que la de los demás cultivos recién comienza. Sin embargo, las lluvias recientes y la inestabilidad climática han afectado el avance de las tareas, dificultado el secado de los cultivos y el acceso de las maquinarias a los lotes.



Según reportes de colaboradores, los cultivos atravesaron episodios de estrés térmico e hídrico; sin embargo, el impacto no fue tan significativo en comparación a enero. El sorgo fue el cultivo más afectado, registrando un aumento de 8 puntos porcentuales en condición de regular y mal estado general.


Durante la primera quincena de abril, todos los cultivos ya habían superado el período de definición de rendimientos. La cosecha de soja y maíz tempranos comenzó de forma lenta, mientras que la soja y el maíz tardíos transitan sus etapas finales al igual que el sorgo y el maní.



En cuanto a la sanidad de los cultivos, según datos provistos por colaboradores, en soja se registró presencia moderada de arañuela (*Tetranychus urticae*), oruga medidora (*Rachiplusia nu*), oruga bolillera (*Helicoverpa gelatopoeon*) y el complejo de chinches (*Nezara viridula*, *Piezodorus grossus* y *Dichelops baccarum*). Además, se reportaron enfermedades de fin de ciclo. En maíz, se observó la presencia de oruga de la espiga (*Helicoverpa zea*), tizón (*Exserohilum turcicum*), y oruga cogollera (*Spodoptera frugiperda*). Mientras que en sorgo se registraron casos de pulgones.

El maíz se destaca por su recuperación frente a la campaña anterior


Teniendo en cuenta los episodios registrados durante la campaña pasada con la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), se espera este año una fuerte recuperación en los rindes, especialmente en los departamentos más afectados por la plaga. En el caso de Río Seco, por ejemplo, las proyecciones indican un incremento de hasta el 88% en comparación con la campaña anterior.




Pronóstico

El pronóstico de las próximas semanas será crucial para el avance de cosecha de los cultivos, tanto por el secado para llegar a humedad de cosecha como para el ingreso de las maquinarias para realizar la labor correspondiente.



Pronostico de precipitación acumulada
Semana 1: del 25 de abril al 01 de mayo de 2025



Pronostico de Temperatura media
Semana 1: del 25 de abril al 01 de mayo del 2025




Agua útil en el perfil



La vista de los cultivos desde los satélites


Mapa de Anomalía NDVI de cultivos estivales
15-Mar al 14-Abr 2025 vs Promedio histórico (2016-2025)




Se analizaron imágenes diarias del sensor MODIS para evaluar anomalías del NDVI en cultivos estivales extensivos. El mapa resultante muestra diferencias entre los valores actuales y el promedio histórico, destacando su distribución espacial. Las anomalías negativas se concentran en el sur (Gral. Roca, centro-este de Río Cuarto) y centro-norte de la provincia (Colón, Totoral, Río Seco), mientras que las positivas predominan en el resto del territorio. Las anomalías muy positivas se ubican principalmente en Marcos Juárez, centro de Unión, sur de Santa María y noroeste de Tercero Arriba.

Comparado con el análisis anterior (febrero-marzo), se registró una disminución de 13 puntos porcentuales en las anomalías negativas y un aumento de 20 puntos en las positivas. Las anomalías muy positivas se mantuvieron estables, y las normales disminuyeron 7 puntos. Estos cambios, en gran parte, se atribuyen a las lluvias del último mes, que mejoraron el estado general de los cultivos.

Mapa de Anomalía NDVI de cultivos estivales
15-Mar al 14-Abr 2025 vs Promedio histórico (2016-2025)



Anomalía NDVI - 15 Mar al 14 Abr 2025



Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

 **B C C B A**
Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637 Int. 1111